



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“  
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија  
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566

Факс: 011-2685-735

Електронска пошта: [kabinet@batut.org.rs](mailto:kabinet@batut.org.rs)

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

**ПРЕПОРУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И КОРИСНИКЕ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ  
ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД COVID-19:  
МАРТ 2024**

3 4 MAR 2024

Бр 1795/1

У дужем периоду се региструје ниска учесталост инфицираних SARS-CoV-2 у Србији и очекује се одржавање таквог тренда током наредног периода. С обзиром на то да постоји одређени степен имунитета у популацији стечен било током ранијих инфекција, вакцинацијом или комбинацијом ова два механизма (тзв. хибридни имунитет), не очекује се нагло и интензивно повећање броја инфекција, нарочито у млађим узрасним групама и код особа без хроничних болести и стања ослабљеног имунитета.

Више респираторних инфекција изазваних вирусима имају сличне клиничке манифестације и путеве преношења као и COVID-19, те су и опште мере превенције усмерене на једну болест истовремено ефективне у спречавању свих вирусних респираторних инфекција које се очекивано јављају са повећаном учесталošћу током сезоне од почетка јесени до краја зиме.

Имајући горе наведено у виду, рационално је применити опште мере заштите од уношења респираторних инфекција и преношења инфекције међу особљем, корисницима и другим особама које у установама социјалне заштите бораве и раде.

Мере се примењују у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Стручно-методолошким упутством за поступање са особама код којих постоји сумња на акутну респираторну инфекцију укључујући и COVID 19 у здравственим установама (Радна група за поступање у условима пандемије COVID-19 Министарства здравља РС).

## Тестирање и превенција COVID-19 у установама социјалне заштите

Превентивна мера	Смернице
<p><b>Тестирање запослених и корисника у установама социјалне заштите</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Није обавезно и не врши се рутински.</li> <li>- Није обавезно за пријем нових корисника, без обзира на врсту установе социјалне заштите.</li> <li>- Тестирање запослених и корисника обавља се код појаве симптома који могу указати на COVID-19. До пристизања резултата теста запослени и/или корисник обавезно носи заштитну маску и смањује интензитет контакта само на неопходне. Тестирање се спроводи антигенским тестом. У ситуацијама када је антигенски тест негативан, а особа има симптоме који указују на COVID-19 потребно је урадити PCR тест. Уколико антигенски тест није доступан иницијално тестирање се врши PCR тестом.</li> <li>- Скрининг тестирање, тестирање у случају појаве епидемије у установама социјалне заштите обавља се једино по налогу епидемиолога током епидемиолошког истраживања.</li> </ul>
<p><b>Корисници и запослени у установама социјалне заштите позитивни на антигенском или PCR тесту</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 изолација траје 7 (седам) дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан. Изолација се након 7. дана прекида без контролног тестирања уколико је пацијент афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и других симптома COVID-19. Након 7. дана препоручује се коришћење заштитне маске у присуству других особа током наредна три дана (до истека 10. дана од дана позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан).</li> <li>- Уколико корисник и након 7. дана изолације има повишену температуру и/или изражене друге симптоме COVID-19, треба да се саветује са својим лекаром о наставку лечења и изолације и након седмог дана од почетка болести.</li> <li>- За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 код запослених или корисника које имају примарне или секундарне имунодефицијенције изолација траје 14 дана и може се</li> </ul>

	<p>прекинути након 7. дана уколико се добије негативан резултат на PCR тесту урађеном не пре 7. дана од дана почетка изолације. Утврђивање примарне или секундарне имунодефицијенције врши ординирајући лекар.</p>
<p><b>Премештај болесника након хоспиталног лечења COVID-19 у установу социјалне заштите</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Премештај болесника из болнице у установу социјалне заштите врши се након што лекар констатује да су испуњени општи услови за отпуст из болнице, а уколико је: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>А) код особа млађих од 65 година:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прошло најмање седам дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимтоматских болесника уз негативан резултат PCR теста из узорка узетог најмање 24 сата пре планираног отпуста или</li> <li>- прошло најмање 10 дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимтоматских болесника и тада није потребно тестирање.</li> </ul> </li> <li><b>Б) код особа старијих од 65 година и имунокомпромитованих:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прошло најмање 14 дана од почетка болести или првог позитивног резултата теста код асимтоматских болесника уз негативан резултат PCR теста из узорка узетог најмање 24 сата пре планираног отпуста или</li> <li>- прошло најмање 20 дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимтоматских болесника и тада није потребно тестирање</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Премештај болесника након болничког лечења не-ковид болести у установу социјалне заштите</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Премештаја болесника из болнице у установу социјалне заштите врши се без тестирања на SARS-CoV-2 вирус.</li> </ul>
<p><b>Коришћење заштитне маске у установама социјалне заштите</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Није обавезно за кориснике установа социјалне заштите осим у случају појаве симптома респираторне инфекције до пристизања резултата тестирања на COVID-19 уз избегавање контакта са другим корисницима.</li> <li>- Обавезно је за запослене и посетиоце у установама социјалне заштите у свим ситуацијама блиског контакта са корисницима (на удаљености мањој од 1 метра) или током боравка у затвореним просторијама са корисницима.</li> </ul>
<p><b>Епидемија COVID-</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Појава два или више случајева оболевања од COVID-19 код</li> </ul>

<p><b>19 у установама социјалне заштите</b></p>	<p>запослених или корисника установа социјалне заштите сматра се епидемијом. У случају појаве епидемије заразне болести потребно је контактирати институт/завод за јавно здравље ради спровођења епидемиолошког истраживања и предлога мера. Тестирање контаката потврђених случајева COVID-19 не врши се рутински. Одлуку о потреби и учесталости тестирања доноси епидемиолог током епидемиолошког истраживања.</p>
<p><b>Вакцинација против COVID-19 и других вакцинама превентабилних болести</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Промовисање вакцинације против COVID-19 код запослених и корисника установа социјалне заштите</li> <li>- Организовање вакцинације бустер дозама вакцине против COVID-19 код запослених и корисника установа социјалне заштите у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну препоручену имунизацију против COVID-19 (доступно на: <a href="https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID19.pdf">https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID19.pdf</a>)</li> <li>- Промовисање и организовање вакцинације против других заразних болести у складу са Правилником о Програму обавезне и препоруче имунизације становништва против одређених заразних болести (доступно на: <a href="https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-programu-obavezne-i-preporucene-imunizacije-stanovnistva-protiv-odredjenih-zaraznih-bolesti.html">https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-programu-obavezne-i-preporucene-imunizacije-stanovnistva-protiv-odredjenih-zaraznih-bolesti.html</a>), са акцентом на вакцинацију против вируса грипа који се доминантно преноси током зимских месеци.</li> <li>- Организацију вакцинације спровести у договору са територијално надлежним домом здравља у складу са упутствима института/завода за јавно здравље.</li> </ul>
<p><b>Одржавање личне и хигијене простора</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Редовно прање руку и чишћење и дезинфекција стамбеног простора је део опште хигијене и посебно је значајно да се учесталост прања руку и чишћење стамбеног простора повећа у ситуацији појаве епидемије заразне болести у установама социјалне заштите.</li> </ul>

## 1. Посете установама социјалне заштите

Превентивна мера	Смернице
Посете установама социјалне заштите	<ul style="list-style-type: none"><li>- Дозвољене без посебних ограничења.</li><li>- Особа која долази или одлази у посету је потребно да је без симптома COVID-19 или неке друге респираторне инфекције.</li><li>- Лица која улазе и бораве у установама социјалне заштите у обавези су да носе заштитне маске.</li><li>- Посете корисницима оболелим од COVID-19 су могуће уколико се ради о тешко оболелим корисницима, у терминалним стадијумима болести или корисницима којима је потребна посебна нега, али уз ограничење броја особа током посета на највише две особе у истом тренутку, уз обавезно коришћење заштитне маске и прање руку.</li></ul>
Издазак корисника из установа социјалне заштите без или са ноћењем	<ul style="list-style-type: none"><li>- Дозвољен без посебних ограничења.</li><li>- За повратак корисника у установу није потребно тестирање на SARS-CoV-2 вирус.</li></ul>

Препоруке сачинили:

Доц. др Марија Милић, епидемиолог

Др Владан Шапоњић, епидемиолог

В. Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Верица Јовановић

